

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Ibuprofeno Tricalma 200 mg comprimidos revestidos ibuprofeno

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Ibuprofeno Tricalma e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Ibuprofeno Tricalma
3. Como tomar Ibuprofeno Tricalma
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Ibuprofeno Tricalma
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Ibuprofeno Tricalma e para que é utilizado

O ibuprofeno pertence ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroides que apresentam ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética.

Ibuprofeno Tricalma está indicado nas seguintes situações:

- dores leves a moderadas - alívio de dores musculares, dores de dentes e cefaleias
- perturbações menstruais - dores menstruais
- febre (duração inferior a 3 dias).

2. O que precisa de saber antes de tomar Ibuprofeno Tricalma

Não tome Ibuprofeno Tricalma

- se tem alergia ao ibuprofeno ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6)
- se tem antecedentes de asma, rinite, urticária, edema angioneurótico ou broncospasmo associados ao uso de ácido acetilsalicílico ou outros fármacos anti inflamatórios não esteroides
- se tem antecedentes de hemorragia gastrointestinal ou perfuração, relacionada com terapêutica com anti-inflamatório não esteroide anterior
- se tem úlcera péptica/hemorragia ativa ou história de úlcera péptica/hemorragia recorrente (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia comprovada)
- se tem antecedentes de retite (inflamação do reto) ou retorragia (perda de sangue pelo reto)
- se tem alterações da coagulação
- se tem insuficiência renal grave
- se tem insuficiência hepática
- se tem insuficiência cardíaca grave

- durante o último trimestre de gravidez.

Advertências e precauções

Se sofre de insuficiência renal ligeira a moderada ou insuficiência cardíaca. Antes do início e durante a terapêutica deverá ser feita uma avaliação regular da função renal. Em caso de deterioração o tratamento deverá ser interrompido.

Se sofre de lúpus eritematoso sistémico ou outras doenças autoimunes, devido ao risco de meningite asséptica e/ou insuficiência renal.

Se apresenta sintomas que sugiram lesão do fígado (anorexia, náuseas, vômitos, icterícia) e/ou apresenta alterações da função hepática (transaminases, bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-GT) a sua função hepática deve ser monitorizada. Poderá ser necessário interromper o tratamento.

Se sentir alterações da visão durante o tratamento com ibuprofeno, deverá suspender o tratamento e realizar um exame oftalmológico.

Se toma corticosteroides, anticoagulantes (p. ex. varfarina), inibidores da recaptação da serotonina e antiagregantes plaquetários tais como o ácido acetilsalicílico devido ao risco de hemorragia gastrointestinal ou ulceração.

Se tem história de doença gastrointestinal (colite ulcerosa ou doença de Crohn).

Se tem hipertensão e/ou insuficiência cardíaca.

Os medicamentos anti-inflamatórios ou de alívio da dor, como o ibuprofeno, podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco ou AVC, particularmente quando são utilizadas doses altas. Não exceda a dose ou a duração recomendada para o tratamento.

Deve falar com o seu médico ou farmacêutico sobre o seu tratamento antes de tomar Ibuprofeno Tricalma se:

- tiver problemas do coração, incluindo insuficiência cardíaca, angina (dor no peito), ou se já tiver tido um ataque cardíaco, cirurgia de bypass, doença arterial periférica (má circulação nas pernas ou pés devido a artérias estreitas ou bloqueadas) ou qualquer tipo de AVC (incluindo mini-AVC ou acidente isquémico transitório “AIT”).

- tiver a tensão alta, diabetes, colesterol, antecedentes familiares de doença do coração ou AVC, ou se fumar.

- tem uma infeção – ver abaixo o título «Infeções».

Infeções

Ibuprofeno Tricalma pode ocultar sinais de infeções, tais como febre e dor. Portanto, é possível que Ibuprofeno Tricalma possa atrasar o tratamento adequado da infeção, o que pode levar a um risco aumentado de complicações. Isto foi observado na pneumonia causada por bactérias e em infeções bacterianas da pele relacionadas com a varicela. Se estiver a tomar este medicamento enquanto tem uma infeção e os seus sintomas da infeção persistirem ou piorarem, consulte imediatamente um médico.

Se apresenta perturbações menstruais.

Ibuprofeno Tricalma não deve ser usado para automedicação da febre elevada (superior a 39,5 °C), febre de duração superior a 3 dias ou febre recorrente, exceto se prescrito pelo médico, pois estas situações podem requerer avaliação e tratamento médico.

O ibuprofeno pertence a um grupo de medicamentos que podem reduzir a fertilidade nas mulheres. Este efeito é reversível após paragem do tratamento.

Se é idoso.

Reação alérgica

Foram notificados sinais de uma reação alérgica a este medicamento, incluindo dificuldades em respirar, inchaço da face e do pescoço (angioedema) e dor no peito, com o ibuprofeno. Pare de tomar Ibuprofeno Tricalma e consulte um médico ou procure imediatamente o serviço de emergência, se detetar algum destes sinais.

Reações cutâneas

Foram relatadas reações adversas cutâneas graves (RCAG), incluindo dermatite exfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, reação a fármacos com eosinofilia e sintomas sistémicos (DRESS) e pustulose exantematosa aguda generalizada (PEAG) em associação com tratamento com ibuprofeno. Pare de tomar Ibuprofeno Tricalma EF e consulte um médico imediatamente se detetar algum dos sintomas relacionados com as reações cutâneas graves descritas na secção 4.

Outros medicamentos e Ibuprofeno Tricalma

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Ibuprofeno Tricalma pode afetar ou ser afetado por alguns outros medicamentos. Por exemplo:

[...]

- medicamentos anticoagulantes (ou seja, que impedem a coagulação do sangue como, por exemplo, aspirina/ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina)
- medicamentos que reduzem a tensão alta (inibidores da ECA como o captopril, beta-bloqueadores como medicamentos à base de atenolol, antagonistas do recetor da angiotensina II como o losartan)

A administração simultânea de ibuprofeno e dos seguintes fármacos necessita de uma vigilância rigorosa do estado clínico e biológico do doente:

Antidiabéticos orais, anticoagulantes (orais e parentéricos) e antiepiléticos: a associação com anticoagulantes orais, heparina por via parentérica e ticlopidina, aumenta o risco hemorrágico por inibição da função plaquetária e agressão da mucosa gastroduodenal.

Caso não se possa evitar esta associação, é necessária uma vigilância clínica estreita, com a determinação de tempos de hemorragia e protrombina.

Outros anti-inflamatórios não esteroides/salicilatos: a administração concomitante de ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroides (salicilatos, fenilbutazona, indometacina, etc.) pode potenciar os efeitos adversos sobre o trato gastrointestinal.

Em doentes com história de úlcera e em idosos deve-se considerar a administração de agentes protetores, assim como em doentes que necessitem de tomar simultaneamente ácido acetilsalicílico em doses baixas, ou outros medicamentos que aumentem o risco gastrointestinal.

Metotrexato: o uso simultâneo dos dois fármacos potencia a toxicidade do metotrexato.

Diuréticos, Inibidores da Enzima da Conversão da Angiotensina (IECA) e Antagonistas da Angiotensina II (AA II): os AINEs podem inibir a eficácia dos diuréticos assim como de outros medicamentos antihipertensores. Nalguns doentes com função renal diminuída, a administração

simultânea de um IECA ou de um AA II pode levar ao agravamento da função renal. Esta associação deve ser administrada com precaução, especialmente em doentes idosos.

A administração conjunta com diuréticos poupadores de potássio pode aumentar os níveis plasmáticos de potássio.

Lítio: a administração simultânea de ibuprofeno e lítio exige uma monitorização apertada dos níveis de lítio.

Digoxina: a administração ao mesmo tempo (conjunta) pode aumentar a concentração plasmática de digoxina.

Ciclosporina: a administração ao mesmo tempo (conjunta) pode aumentar a nefrotoxicidade da ciclosporina.

Probenecide e sulfampirazona: podem causar um atraso na excreção de ibuprofeno, aumentando os seus níveis plasmáticos.

Corticosteroides: aumento do risco de ulceração ou hemorragia gastrointestinal.

Anticoagulantes (exemplo varfarina): a administração ao mesmo tempo (conjunta) aumenta o risco de ulceração e hemorragia gastrointestinal.

Agentes antiagregantes plaquetários e inibidores seletivos da recaptção da serotonina: a administração ao mesmo tempo (conjunta) aumenta o risco de hemorragia gastrointestinal.

Alguns outros medicamentos podem também afetar ou ser afetados pelo tratamento com Ibuprofeno Tricalma. Por este motivo, deverá falar sempre com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Ibuprofeno Tricalma com outros medicamentos.

Ibuprofeno Tricalma com alimentos e bebidas

Ibuprofeno Tricalma deverá ser tomado de preferência após as principais refeições ou com auxílio de um pouco de leite.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não tome Ibuprofeno Tricalma se estiver nos últimos 3 meses da gravidez, pois pode prejudicar o feto ou causar problemas no parto. Pode causar problemas renais e cardíacos no feto. Pode afetar a sua tendência e a do seu bebé para hemorragias e fazer com que o trabalho de parto seja mais tarde ou mais longo do que o esperado. Não deve tomar Ibuprofeno Tricalma durante os primeiros 6 meses de gravidez, a menos que seja absolutamente necessário e aconselhado pelo seu médico. Se necessitar de tratamento durante este período ou enquanto está a tentar engravidar, deve ser utilizada a dose mais baixa durante o menor período de tempo possível. A partir das 20 semanas de gravidez, se tomado durante mais do que alguns dias, Ibuprofeno Tricalma pode causar problemas renais no feto, o que pode levar a níveis baixos de líquido amniótico que envolve o bebé (oligoidrâmnio) ou ao estreitamento de um vaso sanguíneo (canal arterial) no coração do bebé. Se necessitar de tratamento durante mais do que alguns dias, o seu médico poderá recomendar uma monitorização adicional.

Não deve tomar este medicamento se estiver a amamentar.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Espera-se que Ibuprofeno Tricalma não interfira com a condução de veículos nem com o uso de máquinas. Contudo, a ocorrência de determinados efeitos indesejáveis pode condicionar estas atividades.

Ibuprofeno Tricalma contém lactose mono-hidratada

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Ibuprofeno Tricalma contém sódio. Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

3. Como tomar Ibuprofeno Tricalma

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale como seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Deve ser utilizada a menor dose eficaz durante o menor período de tempo necessário para aliviar os sintomas. Se tem uma infecção, consulte imediatamente um médico se os sintomas (tais como febre e dor) persistirem ou piorarem (ver secção 2).

Modo de administração e posologia

Adultos e crianças com idade superior a 12 anos

- Dores leves a moderadas (músculo-esqueléticas, pós-cirúrgicas): 200 a 400 mg, em intervalos de 4 ou 6 horas, sem exceder a dose máxima recomendada de 1200 mg/dia.

- Dor menstrual: na automedicação da dismenorreia a dose inicial é 200 mg cada 4 a 6 horas, podendo aumentar-se para 400 mg, cada 4 a 6 horas. Não deve, no entanto, ser excedida a dose diária de 1200 mg, sem o aconselhamento médico.

- Febre: a dose inicial é de 200 mg, cada 4 a 6 horas, podendo aumentar-se a dose para 400 mg, cada 4 a 6 horas, caso a febre persista e por aconselhamento médico.

Idosos

Nos idosos não há necessidade de adaptar a dose, a não ser que haja insuficiência renal ou hepática graves.

Utilização em crianças e adolescentes

Não é recomendada a sua utilização por crianças com menos de 12 anos exceto quando houver indicação clínica expressa.

Duração do tratamento

Não deve ser excedida a dose de 1200 mg/dia a não ser por expressa necessidade clínica.

O Ibuprofeno Tricalma não deve ser utilizado em automedicação na febre por mais de 3 dias exceto se prescrito pelo médico.

O Ibuprofeno Tricalma não deve ser utilizado em automedicação na dor, durante mais de 7 dias nos adultos ou mais de 5 dias em crianças, exceto se prescrito pelo médico, pois uma dor intensa e prolongada pode requerer avaliação e tratamento médico.

Se tomar mais Ibuprofeno Tricalma do que deveria

Se tomar mais Ibuprofeno Tricalma do que deveria ou se os seus filhos tomarem o medicamento por acidente, contacte sempre um médico ou o hospital mais próximo para obter uma opinião do risco e aconselhamento sobre as medidas a tomar.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir náuseas, dor de estômago, vômitos (pode conter sangue), hemorragia gastrointestinal (ver secção 4 abaixo), diarreia, dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, confusão e movimento ocular trémulo. Também agitação, sonolência, desorientação ou coma podem ocorrer. Ocasionalmente, os doentes desenvolvem convulsões. Em doses elevadas, foram notificadas reações de sonolência, dor no peito, palpitações, perda de consciência, convulsões (especialmente em crianças), fraqueza e tonturas, sangue na urina, níveis baixos de potássio no sangue, sensação de corpo frio e problemas respiratórios. Além disso, o tempo de protrombina/INR pode ser prolongado, provavelmente devido à interferência com as ações dos fatores de coagulação circulantes. Podem ocorrer insuficiência renal aguda e lesões hepáticas. É possível a exacerbação da asma em asmáticos. Para além disso, pode ainda verificar-se uma pressão arterial baixa e uma diminuição da respiração.

Caso se tenha esquecido de tomar Ibuprofeno Tricalma

Tente tomar este medicamento conforme indicado pelo seu médico. No entanto, se se esqueceu de tomar uma dose, deverá tomá-la assim que se lembrar, em vez de a tomar na altura da dose seguinte, seguindo depois o esquema habitual.

Não tome uma dose a dobrar para compensar a uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Pare de tomar ibuprofeno e consulte um médico imediatamente se detetar algum dos seguintes sintomas:

- Áreas da pele avermelhadas não inchadas, em forma de alvo ou circulares, no tronco, muitas vezes com bolhas no centro, descamação da pele, úlceras na boca, garganta, nariz, órgãos genitais e olhos. Estas erupções cutâneas graves podem ser antecedidas de febre e sintomas semelhantes à gripe [dermatite exfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica].
- Erupção cutânea generalizada, temperatura corporal elevada e gânglios linfáticos aumentados (síndrome DRESS).
- Uma erupção cutânea disseminada, vermelha e escamosa com inchaço por baixo da pele e bolhas, acompanhada de febre. Os sintomas aparecem habitualmente no início do tratamento (pustulose exantematososa aguda generalizada).

Os efeitos indesejáveis mais frequentes incluem náuseas, dispepsia, vômitos, hematemese, flatulência, dor abdominal, diarreia, obstipação, melena (sangue nas fezes), estomatite ulcerosa, exacerbação de colite ou doença de Crohn, vertigens, cefaleias, nervosismo.

Menos frequentemente têm vindo a ser observados casos de gastrite, depressão, insónia, confusão, labilidade emocional, sonolência, meningite asséptica com febre e coma, eritema (rubor) maculopapular e multiforme, prurido (comichão), , urticária (erupção de pápulas róseas ou esbranquiçadas, semelhantes a picada de urtiga, pruriginosas ou que provocam sensação de queimadura), alopecia (queda de cabelo), acne, acufenos (zumbidos), diminuição da acuidade auditiva, ambliopia (visão turva, escotomas e/ou alteração da visão cromática), diminuição do apetite.

Foram também reportados casos de neutropenia, agranulocitose, anemia aplástica, anemia hemolítica, trombocitopenia, eosinofilia, diminuição da hemoglobina, edema, retenção de fluidos, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, palpitações, asma, pneumopatia a eosinófilos (afeção do pulmão), broncospasmo, insuficiência renal, poliúria (volume urinário excessivo), disúria (micção dolorosa), hematúria (sangue na urina) e elevações ligeiras e transitórias das transaminases, fosfatase alcalina e gama-GT (enzimas hepáticos).

Raramente foram descritos casos de hepatite aguda citolítica ou colestática grave, parestesias (sensação anormal de picadas ou formigueiro), alucinações, pseudotumor cerebri, conjuntivite, diplopia (visão dupla), nevrite ótica, cataratas, epistaxis (hemorragia nasal), menorragia (menstruação abundante), arritmia (taquicardia ou bradicardia sinusal), necrose papilar renal, nefropatia túbulo-intersticial aguda e síndrome nefrótica.

Os medicamentos tais como o Ibuprofeno Tricalma podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) ou AVC.

Efeitos indesejáveis muito raros: Reações adversas cutâneas graves (RCAG) (incluindo eritema multiforme, dermatite exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica).

Outros: anafilaxia, doença do soro, edema angioneurótico, vasculite de Henoch Schonlein. Foram também descritos casos de estomatite ulcerosa, esofagite, pancreatite, rinite e febre.

Podem ocorrer, em particular nos idosos, úlceras pépticas, perfuração ou hemorragia gastrointestinais potencialmente fatais.

Os efeitos indesejáveis poderão ser reduzidos utilizando a menor dose eficaz durante o período de tempo necessário para controlar a sintomatologia.

Ibuprofeno Tricalma deve ser interrompido aos primeiros sinais de rash, lesões mucosas, ou outras manifestações de alergia.

Frequência desconhecida (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

- Erupção cutânea generalizada, avermelhada e descamativa com inchaços sob a pele e bolhas, localizada sobretudo nas pregas da pele, tronco e extremidades superiores, acompanhada por febre no início do tratamento (Pustulose exantematosa aguda generalizada). Pare imediatamente de tomar Ibuprofeno Tricalma se desenvolver estes sintomas e procure assistência médica. Ver também a secção 2. A pele torna-se sensível à luz.

- Pode ocorrer uma reação cutânea grave conhecida como síndrome de DRESS (Reação a Fármacos com eosinofilia e sintomas sistémicos). Os sintomas de DRESS incluem: erupção cutânea, febre, inchaço dos nódulos linfáticos e um aumento de eosinófilos (um tipo de células sanguíneas brancas).

- Dor no peito, que pode ser um sinal de uma reação alérgica potencialmente grave chamada síndrome de Kounis

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Ibuprofeno Tricalma

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após "EXP". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Ibuprofeno Tricalma

A substância ativa é o ibuprofeno. Cada comprimido revestido contém 200 mg de ibuprofeno.

Os outros componentes são: núcleo: lactose mono-hidratada, amido de milho, hipromelose 6 CPS, água purificada, celulose microcristalina 102, croscarmelose de sódio, sílica anidra coloidal e estearato de magnésio; revestimento: Opadry 04 G 280001 Branco (hidroxipropilmetilcelulose, polietilenoglicol 400, polietilenoglicol 6000, dióxido de titânio e água purificada).

Qual o aspeto de Ibuprofeno Tricalma e o conteúdo da embalagem

Ibuprofeno Tricalma apresenta-se na forma de comprimidos revestidos, oblongos, lisos e de cor branca, estando disponível em embalagens de 20, 30 ou 60 unidades acondicionados em blisters.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19
2700-487 Amadora
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em Outubro de 2024